

# Fülbetegségek

FÉNYKÉPEZTE: BÖHM ZSUZSA – ÍRTA: DR. PÁLINKÁS IMRE


**A** fülbetegségek diagnosztikája, gyógykezelése állatorvosi feladat. A hallójáratba csak speciális vizsgáló eszközzel lehet betekinteni, ami nélkülözhetetlen a fülelváltozások szakszerű állatorvosi vizsgálatához és a gyógyulást hozó, hatékony kezeléséhez.

A homeopátiás gyógyszerek már azelőtt használhatók, hogy a cica állatorvos elé kerülne, vagy a kezelés szerves része is lehet.

Kezdjük mindjárt a leginkább szembeütő fülrészlet, a fülkagyló betegségével a *vérömlennyel*, az úgynevezett othaematomával, amely a fülkagyló porca és a bőre közötti erek sérüléséből adódik.

Ilyenkor viszonylag nagy mennyiségű vér kerül a két réteg közé és ez a duzzanat egyre nagyobb lesz, amíg be nem alvad a vér. Az ok kiderítése (például a külső-hallójárat gyulladása) és a műtéti beavatkozás elvégzése állatorvosi feladat. Addig is adjunk a macskáknak minél előbb *Aconitumot C30*-as potenciában naponta 4–5-ször, 1 napon keresztül.

A kezelést egészítsük ki *Arnica*val *C30*-as potenciá-



ban naponta 3-szor, 5–6 napon át, az esetleges műtétet követően is, esetleg *C6*-os *Staphysagria*val kombinálva.

A fül bőrének *Arnica* kenőccsel történő kezelése is nagyon hasznos lehet.

Ha nagyon sokat vakarja a fülét a macskánk, mindig gondoljunk *fülrühösségre*. Ennek a parazitás betegségnek is van homeopátiás megoldása az alábbiak szerint:

*Psorinum* (a rüh hatására kialakult hólyagok váladékából készült, ún. *nosoda*) *C200* potenciában hetente egy alkalommal.


A korai stádiumban, amikor még csak kevésbé érzékeny a fül, akkor a *Hepar sulfur C30*-as potenciában, naponta egyszer segíthet.

Ha a fülváladék nyálkás, nyúlós, tapadós, bevált a *Graphit* alkalmazása *C6*-os potenciában naponta háromszor adva gyó-

gyulásig. Itt jegyezném meg, hogy fontos, hogy abbahagyjuk a kezelést, ha gyógyult egy beteg, mert a szer további adása előhozhatja újra a gyógyszerképre jellemző tüneteket.

Sok esetben nem könnyű dolog elkülöníteni a szövődményes fülrűhtől a gennyos baktériumos vagy gombás eredetű külső hallójárat gyulladását, melyek ráadásul kombinálódhatnak is. Ezt mindenképpen állatorvosra kell bízni!

Ha feltűnően sűrű szövet-törmelék van a fülben, esetleg gennyos váladékkal keveredett, nagyon hasznos a *Silicea (kovasav) C30*-as potenciában naponta egyszer adva.



Egészséges, piszkos fül

Ehhez hasonlóan működik a *Calcium fluoricum* is, amely *C30*-as potenciában segít kitisztítani a fülből a felesleges váladékot.

Ha a fülgyulladás a bal oldalon kezdődik, majd a jobbra

leg, fejét egyik irányba oldalt, lefelé tartja, körbe járkál, füléből néha gennyos váladék ürül. Minél előbb vigyük állatorvoshoz!

Ilyen tünetek esetén azonnal adjunk naponta 4–5-ször



Harc során szerzett  
sebek a fülön

is ráhúzódik, különösen, ha erősen bűzös, hatékony lehet a *Tellurium (fém) C30*-as potenciában naponta egyszer, gyakran 3 hétig is szükséges adni.

Ha estétől reggeli súlyosbodnak a tünetek, nyálzás jelentkezik, a bőr barnán elszineződik, adjunk *Cinnabaris-t (vörös higany-szulfid) C12*-es potenciában naponta egyszer.

Akárcsak a fülrüh esetén, a külsőfül-gyulladásakor is indikált lehet a *Psorinum*, ha a cica sokat vakarózik, meleg helyet keres magának, fültartalma bűzös és szörzete fénytelen, borzas, rendezetlen.

Ilyen esetben naponta egyszer adjuk a *Psorinumot C30*-as potenciában.

Nem ritka a középfül-gyulladása sem macskákban, gyakran idegrendszeri tünetekkel kísérve. Ezek gyakran bakteriális eredetűek.

A gazdinak sokszor az tűnik fel először, hogy az állat mozgása rendezetlen, széde-

*Aconitumot (sisakvirág) C30*-as potenciában.

Ha bal oldali irányba szédül, illetve bukik el a macskánk, adjunk *Stramoniumot* (csattanó maszlag) *C30*-as potenciában naponta egyszer.

Amikor a fejét hátrafesztíti, szinte *S* alakot vesz fel, adjunk *Cicuta virosa-t (gyilkos csomorika) C30*-as potenciában.

Ha feltűnően érzékeny az érintésre, illetve azt rosszul tűri, a fül érintésére nagy fájdalmat jelez, hasznos lehet a *Hepar sulfur (mészkenmáj) D200*-as hígításban naponta egyszer.

A *Belladonna (atropin tartalmú maszlagos nadragulya)* tartalmú *C200*-as potenciát akkor adjuk, ha elsősorban a központi idegrendszeri tünetek dominálnak, a pupillák feltűnően tágak, a pulzus erős, feszes.

Az állat ilyenkor fájdalmában harapóssá válik.